



## 福尔马林-乙酸钙固定液(10%)

### 产品简介：

固定的目的在于保存细胞和组织的原有形态结构，固定剂能阻止内源性溶酶体酶对自身组织和细胞的自溶、抑制细菌和霉菌的生长。固定剂通过凝固、生成添加化合物等使蛋白质内部结构发生改变，从而使酶失活。固定液分为醛类固定液、汞类固定液、醇类固定液、氧化剂类固定液、苦味酸盐类固定液等，较为常用的是醛类中的福尔马林、醇类中的乙醇。

NOVON 福尔马林-乙酸钙固定液(10%)又称甲醛钙固定液，主要由甲醛、氯化钠、去离子水组成，该固定液尤其适用于保护脂肪的组织固定。

### 产品组成：

名称	SS0306	保存条件
福尔马林-乙酸钙固定液(10%)	500ml	RT 避光
说明书	1 份	

### 操作步骤(仅供参考)：

1、一般标本固定时间控制在 1~4h/mm，大标本应适当延长固定时间。

### 注意事项：

- 1、该固定液有一定刺激性和腐蚀性，请在通风较好的环境下小心操作，避免吸入。
- 2、组织取材的厚度不同，固定时间也不同。常规活检组织比较适合的厚度为 2~4mm，一般不超过 6mm。对组织恰当的选材有利于固定液的渗透。
- 3、固定液的容量应足够，一般固定液与组织块的体积比率应大于 10:1。如果容积不够大，可以在固定期间更换 1~3 次固定液。
- 4、温度对固定的影响很明显，提高温度可以加速固定作用，但温度不宜过高。
- 5、取出新鲜组织后，应及时固定，无法及时固定时，应保存于生理盐水中及时送检。

**有效期：** 12 个月有效。